

BCG予防接種のお知らせ

龍郷町ではBCG予防接種が個別接種となっています。

【対象者】 1歳未満児

※標準接種年齢：5～8か月児

【接種回数】 1回

【接種場所】 指定医療機関

【持参する物】 母子手帳、予診票

※予診票は同封の「予診票綴」から切り離して
ご使用ください。

【予防接種を受ける前に】

受診前に別冊『予防接種手帳』をお読みください。

特にP16～17のBCG（結核の予防）は必ず目を通してください。

接種を受けることができないお子さん	接種を受ける際に注意が必要なお子さん
①明らかに発熱（通常37.5℃以上）をしている場合 ②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合お子さん ③その他、医師が不適当な状態と判断した場合	①先天性代謝異常、心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気やその他何らかの病気、基礎疾患のある人 ②受けるべき予防接種の接種液の成分でアナフィラキシーを起こしたことがある人 ③予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がみられたことがある人 ④過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある人 ⑤過去に免疫不全と診断された人及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。 ⑥明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合 ⑦ワクチンソンの製造糧における培養に使用する卵の成分・抗生物質・安定剤などでアレルギーがあると言われたことがある人

【主な指定医療機関】

接種の際は必ず予約が必要です。

医療機関名	電話番号	住所
みんなの診療所	62-5010	龍郷町中勝字松下476-1
県立大島病院	52-3611	名瀬真名津町18-1
政小児科内科医院	52-0017	名瀬柳町4-43
奄美中央病院	52-6565	名瀬長浜町12-24
ファミリークリニックネリヤ	57-7177	名瀬和光町31-14
むかいクリニック	55-1777	名瀬小浜町24-10
朝沼クリニック	52-0337	名瀬石橋町7-1
稲医院	52-0486	名瀬金久町5-4
記念クリニック奄美	55-2271	笠利町節田1450-1
笠利病院	55-2222	笠利町中金久120

★ その他にも接種できる医療機関があります。
詳しくはお問い合わせください。




＜問い合わせ先＞ 子ども子育て応援課 予防接種係 ☎：69-4555

【接種後の注意】

- ① 予防接種を受けた後 30 分程度は、急な副反応が起ることがあります。
医療機関で様子を見ましょう。
- ② 接種部位は清潔に保ちましょう。
入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすらないでください。
- ③ 当日は、激しい運動は避けましょう。
- ④ 接種後約2週間で針の痕がふくらみ、1ヶ月ぐらいでウミをもつようになります。その後かさつたができて接種後3ヶ月までには治り、小さな傷あとが残るだけになります。
これは異常反応ではなく、BCG予防接種により免疫がついた証拠です。
自然に治るので、バンソウコウや包帯はしないでください。
注射部位が化膿し長引くようなら医療機関を受診してください。
- ⑤ 熱がでるなどの副反応はありませんが、時にはわきの下のリンパが腫れることがあります。
ほとんどが2～3ヶ月で消えますが、大きくなるようなら医師に相談してください。
- ⑥ お子さまが接種前に結核菌に感染している場合は、接種後10日以内にコッホ現象（接種部位の発赤・腫脹（はれ）及び接種部位の化膿等を来し、通常2週間から4週間後に消失、瘢痕化し、治癒する一連の反応）が起こることがあります。
通常の接種部位の様相の発現時期と異なり、接種後数日間のうちの早い段階で発現します。
この反応がみられた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- ⑦ 4週間は他の予防接種はできません。



★予防接種を安心して受けるために



種 類	対象年齢及び注意事項	
ヒブ 小児用肺炎球菌	生後 2 か月以上 5 歳に至るまで	接種開始時の月齢によって接種回数が決まります。
BCG	生後 3 か月以上 1 歳に至るまで	1 歳未満児 標準接種年齢は 5～8 か月児
四種混合	生後 3 か月以上 7 歳 6 か月に至るまで	1 期初回：20 日～56 日の間隔で 3 回接種します（注 1）。 1 期追加：1 期終了後、1 年（12～18 月）あけて 1 回接種します（注 2）。
MR（麻しん・風しん混合）	1 期：1 歳～2 歳に至るまで 2 期：就学 1 年前	麻しん又は風しんに罹患した場合にも MR を接種できます。
水痘 （水ぼうそう）	1 歳から 3 歳に至るまで	3 か月以上の間隔をあけて 2 回接種します。 ※水痘にかかった場合は、受けることは出来ません。
日本脳炎	1 期：生後 6 か月～7 歳 6 か月に至るまで 2 期：9 歳以上 13 歳未満の者 【特例措置】 H7.4.2～H19.4.1 生は、20 歳未満まで接種可 H19.4.2～H21.10.1 生で H22 年 3 月 31 日までに日本脳炎 1 期が終了していない者は、9 歳以上 13 歳未満まで接種可	1 期初回：6 日～28 日までの間隔で 2 回接種 1 期追加：1 期終了後おおむね 1 年（11 月～13 月）あけて、1 回接種します。（注 2） 2 期：9 歳以上で 1 回接種します
二種混合 （ジフテリア・破傷風）	2 期：11 歳以上 13 歳未満	指定の日時に接種します。 小学 6 年生に通知します。
子宮頸がん	小 6～高校 1 年の女子 ※2 種類のワクチンがあり、同じワクチンを 3 回接種する。	H25 年 6 月 15 日から子宮頸がんワクチンは積極的に勧めていません。 接種を希望される方はお問い合わせ下さい。

★各予防接種は、対象年齢を過ぎると任意接種（有料）となります。
但し、長期にわたって療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方については、接種できる場合がありますのでお問い合わせください。

（注 1）平成 26 年 4 月に予防接種規則が改正され、対象年齢内であれば定期として接種できます。
（注 2）四種混合、日本脳炎の 1 期追加は 1 期初回終了後から 6 か月以上あけると接種することが出来ます。