

生後3か月から！



4種混合予防接種のお知らせ

4種混合予防接種とは、従来の3種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）に、不活化ポリオを加えたワクチンの予防接種です。

接種対象者

生後3か月～7歳6か月未満

接種場所

指定の医療機関（裏面参照）

持参する物

予診票・母子手帳 ※対象者は接種料金無料



接種方法及び接種間隔

	標準的な接種年齢	接種回数	接種間隔
初回	生後3か月～生後12か月まで	3回	20日から56日までの間隔をあけて接種
追加		1回	初回接種（3回）終了後、12か月～18か月あけて接種 初回接種終了後最低6か月以上の間隔をおいて接種

☆ 4種混合予防接種は、ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種等と同時接種が可能です。

詳しくは接種を希望される医療機関へお問い合わせください。



4種混合予防接種の種類



○ジフテリア

ジフテリア菌がのどや鼻に感染して高熱、のどの痛み、犬吠様の咳などの症状が起こり、ときに窒息することもあります。また、菌の出す毒素により心筋障害・神経麻痺を起こすこともあります。

○百日咳

普通のかぜのような症状から始まって、しだいに連続性の激しい咳が発作的に起こるようになります。乳幼児は咳で呼吸ができず、痙攣を起こすことや、肺炎や脳症などの重い後遺症を残すこともあります。最近、長引く咳を特徴とする思春期、成人の百日咳がみられ、乳児への感染源となる可能性があります。

○破傷風

破傷風は、土の中にいる破傷風菌が傷口などから体内に侵入して感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために筋肉の痙攣からやがて全身の痙攣を起こすようになります。

○ポリオ

ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。ポリオウイルスに感染しても多くの場合、病気としての明らかな症状は現れずに、知らない間に免疫ができます。しかし、ウイルスが血液を介して脳・脊髄に入り込み、麻痺を起こし、その麻痺が一生残ってしまうことがあります。

現在、残念ながら特効薬などの治療法はありません。

4種混合の副反応について

主な副反応 ※ほとんどは接種3日後までに見られる。	●注射部位にみられる症状 ・紅斑（赤くなること） ・硬結（硬くなること） ・腫脹（腫れ）	●全身にみられる症状 ・発熱（37.5℃以上） ・気分変化 ・下痢 ・鼻漏（鼻水） ・咳嗽（咳が出る） ・発疹 ・食欲減退 ・咽頭紅斑（のどが赤くなる） ・嘔吐
重大な副反応	1) ショック、アナフィラキシー様症状 ※接種後30分以内に起こる激しい全身反応。蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫等（0.1%未満） 2) 血小板減少性紫斑病（0.1%未満） 3) 脳症（頻度不明） 4) けいれん（0.4%）	

【4種混合ワクチン添付文書より】

予防接種不適合者・予防接種要注意者




接種を受けることができない人	接種を受ける際に注意が必要な人
① 明らかに発熱（37.5℃以上）している者 ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 ③ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者 ④ その他、医師が不適当な状態と判断した場合	① 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などの基礎疾患のある者 ② 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 ③ 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 ④ 過去にけいれん（ひきつけ）を起こした者 ⑤ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

予防接種を受けに行く前に確認を

- ① **お子さんの体調はよいですか。**当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認しましょう。
- ② この**通知書を読みましたか？**必要性、効果及び副反応などを理解していますか。
- ③ **母子手帳**は持ちましたか。
- ④ **予診票の記入**はすみしましたか。

接種を受けた後の注意事項

- ① 予防接種した当日は入浴は差し支えありません。
注射部位は清潔に保ち、強くこすったり、激しい運動をすることはやめましょう。
- ② 気になる症状がみられた場合は、接種医に相談してください。
- ③ 接種の後、他の予防接種を受ける場合は**6日以上**間隔をあけてください。
（参考）生ワクチンを接種した日の翌日から、別の種類の接種を行うまでの間隔は27日以上あけます。不活化ワクチンの場合は6日以上です。



生ワクチン：MR（麻しん風しん）、BCG、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルス
 不活化ワクチン：三種混合、四種混合、ポリオ、日本脳炎、インフルエンザ、ヒブ、肺炎球菌

健康被害救済制度について

予防接種法に基づく定期の予防接種を、本町が契約している医療機関において接種し、万が一健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認められた場合は、救済を受けることになります。

★主な接種医療機関一覧★

※ワクチンの準備がありますので、必ず予約をしてから受診してください。



医療機関名	住 所	電話 番号	B 型 肝 炎	ヒ ブ	肺 炎 球 菌	四 種 混 合	B C G	M R	水 痘	日 本 脳 炎	ロ タ ウ イ ル ス	二 種 混 合
竜郷中央クリニック	龍郷町瀬留 984-4	62-2525	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×
肥後診療所	龍郷町秋名 1886	62-4023	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×
肥後医院	龍郷町赤尾木 1485	62-3023	×	×	×	×	×	○	×	○	×	○
みんなの診療所	龍郷町中勝字松下 476-1	62-5010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
県立大島病院	奄美市名瀬真名津町 18-1	52-3611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
政小児科内科医院	奄美市名瀬柳町 4-43	52-0017	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
奄美中央病院	奄美市名瀬長浜町 12-24	52-6565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファミリークリニックネリヤ	奄美市名瀬和光町 31-14	57-7177	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
せきクリニック	奄美市名瀬末広町 1-9	55-0070	×	×	×	○	×	○	○	○	×	○
むかいクリニック	奄美市名瀬小浜町 24-10	55-1777	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
かずや内科	奄美市名瀬平松町 532	53-6020	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
朝沼クリニック	奄美市名瀬石橋町 7-1	55-1555	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
つばたクリニック	奄美市名瀬久里 9-2	57-7771	×	×	○	×	×	○	○	○	×	○
よしかわクリニック	奄美市名瀬和光町 1-2	52-5300	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○
記念クリニック	奄美市笠利町節田 1450-1	55-2271	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
笠利病院	奄美市笠利町中金久 120	55-2222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

他の医療機関等で接種を希望する場合は、役場 子ども子育て応援課 までお問い合わせください。



お問い合わせ先：龍郷町役場 子ども子育て応援課 69-4555（予防接種係）